

农作物病虫害测报

第三期

鹤山市农业农村局

二〇二〇年四月二十七日发布

当前水稻主要病虫害防治意见

据我局农技中心4月20-26日到全市各镇主要水稻种植区调查，目前我市水稻长势良好，大部分已封行，主要发生病虫害是稻纵卷叶螟，第一代稻纵卷叶螟为害插植早、叶色浓绿的田块，总体属轻发生，卷叶率极低。

一、稻纵卷叶螟 预计第二代稻纵卷叶螟属中等发生，我局农技中心4月20日到桃源、龙口、共和、址山四镇田间调查，亩蛾量址山镇为133头，其余三镇为0。4月24日到雅瑶、址山两镇田间调查，亩蛾量雅瑶镇为266头，址山镇为400头，4月26日到龙口、宅梧两镇田间调查，亩蛾量龙口镇为533头，宅梧镇为580头。据此预计第二代稻纵卷叶螟卵盛孵高峰期为5月1-3日。

二、纹枯病 属轻发生，据我局农技中心4月20-26日田间调查，一般田块病丛率0.5%-1.5%。近期降雨较多，田间封行荫蔽，为纹枯病迅速蔓延提供有利条件。

三、稻飞虱、稻瘟病 均属轻发生，据我局农技中心4月20-26日田间调查，田间鲜见。

四、钻蛀性螟虫 属局部轻发生。据我局农技中心4月20-26日田间调查，个别田块零星发生。

五、防治意见

本次防治以稻纵卷叶螟为主，预防纹枯病，挑治稻飞虱、钻蛀性螟虫。

各镇应及时施药防治，压低前期基数，减轻中后期防治压力，**防治适期为5月2-4日。**

建议农户选用持效期长、粘着性和展着性好的药剂，及时喷施。应对近期的降雨天气影响，药剂推荐亩用量如下：

稻纵卷叶螟及钻蛀性螟虫：氯虫苯甲酰胺【亩用福戈（40%氯虫苯甲酰胺·噻虫嗪）8克，或康宽（20%氯虫苯甲酰胺）10克】、或10%四氯虫酰胺20克、或乙基多杀菌素、或苏云金杆菌或1.8%阿维菌素100毫升、或甘蓝夜蛾核型多角体病毒；

稻飞虱：25%噻嗪酮40克、或10%三氟苯嘧啶10毫升、或25%烯啶虫胺20克、或25%噻虫嗪4克、或25%吡蚜酮20克、或氟啶虫胺腈、或呋虫胺；

纹枯病：32.5%嘧菌酯·苯醚甲环唑30毫升、或19%啶氧·丙环唑67毫升、或30%苯醚甲环唑·丙环唑15毫升、或50%噻呋·己唑醇10克、或20%井冈霉素50克、或噻呋酰胺、或氟环唑；

各地根据实际选择合适药剂，兑水70公斤均匀喷施，药后6小时内遇中雨以上要及时补施。